

Sigmoideoskopi – kikkertundersøgelse af endetarm og nederste del af tyktarmen

Instrumentet der bruges er en tynd bøjelig videokikkert, som føres gennem endetarmsåbningen og op i tyktarmen. Tarmens inderside – slimhinden – kan ses på en videoskærm.

UNDERSØGELSEN

Ved denne undersøgelse er det nødvendigt, at din tarm er ren. Det er derfor vigtigt, at du følger nedenstående anvisning nøje.

Der kan tages vævsprøver og fjernes eventuelle polypper. Det gør ikke ondt.

Hvis du er i regelret blodfortyndende behandling (Marevan, Macumar) kan vi kun kigge, men ikke andet. Ved polypfjernelse og lignende skal du holde pause med blodfortyndende behandling. Det må aftales nærmere.

FØR UNDERSØGELSEN

På apoteket henter du (håndkøb) : 1 Fleet-klyksma klar-til-brug.


DAGEN FØR UNDERSØGELSEN

Du må indtage væske og blød kost uden kerner (supper, franskbrød mm).

PÅ UNDERSØGELSESDAGEN :

Ca. 2 timer før undersøgelsen tager du det udleverede klyksma. Hold på klyxet . Kort efter vil der komme afføring, så du må være i nærheden af et toilet.

Selve undersøgelsen varer fra ca. 10 minutter og kan godt give mavekneb, da det er nødvendigt at blæse lidt luft ind i tarmen.



EFTER UNDERSØGELSEN

Du vil fungere helt normalt og selv kunne køre hjem efter undersøgelsen. Før du går, får du besked om resultatet af undersøgelsen herunder eventuel videre forløb.

Ved forfald bedes du melde afbud senest en uge før undersøgelsen. Ved udeblivelse uden afbud opkræves honorar for udeblivelse.

Denne vejledning anvendes af **Billesbølles Privatklinik** og af **Kirurgisk Klinik Køge**.
(www.privat-klinik.dk og www.kirurgi-koege.dk)
(marts 2009).