

Fjernelse af små knuder

Inden dit indgreb:

Hvis du får blodfortyndende medicin eller fiskeolie, skal du holde pause med dette. Du aftaler med lægen hvor mange dage.

Gå i bad på dagen for dit indgreb. Er området der skal behandles behåret, bedes du fjerne hår med maskine eller saks. Du må ikke barbære med skraber, da der ikke må komme rifter i huden.

Når du kommer i klinikken, vil du blive gjort klar til dit indgreb.

Området vil blive afvasket med klorhexidinsprit, og du vil blive lokalbedøvet. Lokalbedøvelsen kan forårsage kortvarig smerte.

Kirurgen vil fjerne din knude og derefter sy området sammen.

Suturer skal fjernes efter 7-10 dage. Dette kan gøres ved egen læge eller hos os. Bestil gerne tid lige efter dit indgreb, uanset om du ønsker tiden hos egen læge eller hos os.

Plasteret bør sidde minimum 24 timer. Såret må ikke blive vådt de første 24 timer. Herefter fjernes plasteret og du kan tage brusebad. Undgå Spabad, karbad havvand og svømmehal indtil der er fuld ophealing.

Hvis du har fået påsat steristrips, lades de urørt til de selv falder af. De skal dog fjernes inden du kommer til suturfjernelse

I løbet af de første 24 timer kan der komme en skygge af blod eller væske på forbindingen. Hvis plasteret ikke løsner sig, bør du lade det sidde. Er der derimod blod eller væske der siver gennem forbindingen så den bliver våd, bør plasteret skiftes. Du får plaster med hjem til at skifte, hvis det skulle blive nødvendigt.

Alt efter hvor du er blevet opereret på kroppen, kan der være forskellige forholdsregler. Sygeplejersken/Lægen vil orientere dig om dette, før du forlader klinikken.

Evt. komplikationer

Blødning:

Moderat blødning kan evt. stoppes ved fast tryk direkte på såret i 10 min. (brug stof eller køkkenrulle). *Vedvarende blødning* eller stor "bule" under såret, kræver henvendelse til undertegnede, egen læge eller skadestue.

Infektion: Ved feber, rødme, pus, hævelse, dunkende smerter, kontakt os eller egen læge.

Smertebehandling er sjældent nødvendig. Hvis der er smerter anbefales Paracetamol (Panodil, Pamol, Pinex) højst 2 x 500 mg x 4 dagligt. Der kan evt. suppleres med tablet Ipren 200 mg. Fås i håndkøb.

Efterbehandling

Alle friske ar er røde, men bleges af i løbet af 3-6 mdr., enkelte først efter 12 mdr. Undlad sol (også solarium) på friske ar, der stadig er røde.

Udeblivelse uden afbud

Der opkræves gebyr på kr. 500,- ved udeblivelse uden afbud til operation.

Afbud skal foretages senest 24 timer før mødetidspunkt på tlf. nr. 5666 1766 eller via mail: kkk@kirurgi-koege.dk

Kirurgisk klinik Køge v/ Saeid Aslani, 56661766, kkk@kirurgi-koege.dk